

Combate à vespa velutina

1. Armadilhagem

- A colocação de armadilhas tem como objetivo capturar vespas fundadoras e, assim, diminuir o aparecimento de novos ninhos. A sua colocação e monitorização deve ser feita, preferencialmente, entre os meses de fevereiro/março e junho, mês em que devem ser removidas.
- Durante este período, o isco deve ser renovado a cada 15 dias.
- Solicita-se que a colocação das armadilhas se faça preferencialmente nas áreas urbanas e periurbanas, para diminuir a probabilidade de ocorrência de ninhos em zonas habitadas ou onde habitualmente circulem pessoas.
- Solicita-se a perfuração da parte lateral superior da armadilha com alguns orifícios, para permitir a fuga de pequenos insetos.

2. Isco (exemplo)

Ingredientes (Proporção):

- 1kg de açúcar;
- 2 litros de água;
- 25gr de fermento de padeiro;

Modo de Preparação:

- Ferver a água numa panela com o açúcar e deixar arrefecer à temperatura ambiente;
- Diluir 25gr de fermento de padeiro numa tigelha com um pouco do preparado anterior;
- Verter o produto final (preparado inicial + fermento diluído) num garrafão de 5L e deixar fermentar pelo período de 24h.

ATENÇÃO:

Não fechar totalmente o garrafão, pois a fermentação do isco produz gás que poderá levar ao seu rebentamento.

Alternativas:

- Groselha e vinho branco ou cerveja e água;
- Sangria (comercial);
- Restos de vinho;
- Água de lavar ceras fermentada;

Em caso de dúvida ligar: 966171159 (Médico Veterinário Municipal)